



# Diniro®

Erbicida di post-emergenza per il mais

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>REGISTRAZIONE N°</b> | 16155 del 24/07/2017   | <b>CLASSIFICAZIONE CLP</b><br><br><b>ATTENZIONE</b> |
| <b>COMPOSIZIONE</b>     | Prosulfuron puro g 4%, Nicosulfuron puro g 10%, Dicamba puro g 40% |  |
| <b>FORMULAZIONE</b>     | Granuli idrodispersibili   |  |
| <b>CONFEZIONI</b>       | Barattolo da 1 kg  |  |
| <b>GRUPPO HRAC</b>      | B; O   |  |

## CAMPI D'APPLICAZIONE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

| COLTURA | DOSI          | MODALITÀ D'IMPIEGO   | INTERVALLO DI SICUREZZA | INFESTANTI SENSIBILI  |
|---------|---------------|--|-------------------------|---|
| Mais    | 0,4-0,5 kg/ha | <p>Usare Diniro in combinazione con Powershut.</p> <p>Distribuire impiegando 200-400 l/ha di acqua</p> <p>Può essere applicato con irroratori a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio per assicurare un'uniforme distribuzione ed una buona copertura del bersaglio.</p> | Non necessario          | <p><b>Infestanti sensibili:</b></p> <p><b>Dicotiledoni:</b><br/> <i>Abutilon theophrasti</i> (cencio molle),<br/> <i>Amaranthus retroflexus</i> (amaranto comune),<br/> <i>Capsella bursa-pastoris</i> (borsapastore comune),<br/> <i>Chenopodium album</i> (farinella),<br/> <i>Convolvulus arvensis</i> (vilucchio),<br/> <i>Datura stramonium</i> (stramonio),<br/> <i>Galium aparine</i> (attaccamano),<br/> <i>Galinsoga parviflora</i> (galinsoga),<br/> <i>Hibiscus frionum</i> (ibisco vescicoso),<br/> <i>Lamium purpureum</i> (lamio purpureo),<br/> <i>Matricaria sp.</i> (camomilla),<br/> <i>Polygonum aviculare</i> (correggiola),<br/> <i>Polygonum lapathifolium</i> (poligono nodoso),<br/> <i>Polygonum persicaria</i> (persicaria),<br/> <i>Sinapis arvensis</i> (senape selvatica),<br/> <i>Solanum nigrum</i> (erba morella),<br/> <i>Sonchus arvensis</i> (<i>Xanthium strumarium</i> (nappola italiana),<br/> <i>Stellaria media</i> (centoccio),<br/> <i>Thlospi arvense</i> (erba storna)</p> <p><b>Graminacee:</b><br/> <i>Echinochloa crus-galli</i> (giavone comune),<br/> <i>Hordeum sp.</i> (orzo selvatico),<br/> <i>Panicum sp.</i> (panico),<br/> <i>Setaria viridis</i> (setaria),<br/> <i>Sorghum halepense</i> (sorghetta).</p> <p><b>Infestanti mediamente sensibili:</b><br/> <i>Calystegia sepium</i> (vilucchione),<br/> <i>Cirsium arvense</i> (cardo campestre),<br/> <i>Portulaca oleracea</i> (portulaca)</p> |

**CONSIGLI D'IMPIEGO:** Utilizzare Diniro® in post emergenza del mais dalla seconda alla ottava foglia della coltura al dosaggio di 0,4-0,5 kg/ha, utilizzare la dose maggiore su infestanti sviluppate o in presenza di perennanti. Utilizzare Diniro® in combinazione con Powershut®. **PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:** Allo scopo di evitare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare al prodotto erbicidi aventi un differente meccanismo d'azione e di adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.