



Impact[®]

Fungicida sistemico ad ampio spettro per vite da vino, fruttiferi, orticole ed estensive

REGISTRAZIONE N°	8064 del 06/05/1992	CLASSIFICAZIONE CLP  ATTENZIONE
COMPOSIZIONE	Flutriafol g. 11.8 (125 g/l)	
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata	
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (10x1)	
GRUPPO FRAC	3	

CAMPI D'APPLICAZIONE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	SPECIE PARASSITA	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Melo e Pero	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i>), Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	15-25 ml/hl (dose massima: 0.25 lt/ha)	Intervenire dall'inizio caduta dei petali all'ingrossamento del frutto. Effettuare al massimo 2 trattamenti con intervallo di 10 giorni.	21 giorni
Pesco	Oidio (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	15-25 ml/hl (dose massima: 0.25 lt/ha)		7 giorni
Vite da Vino	Oidio (<i>Uncinula necator</i> , <i>Oidium tuckeri</i>)	50-75 ml/hl (dose massima: 0.5 lt/ha)	Intervenire, nell'ambito di un programma di difesa antioidica, dall'inizio della fioritura all'invaiaitura. Effettuare massimo 1 trattamento all'anno	21 giorni
Fragola (in campo)	Oidio (<i>Sphaeroteca macularis</i> , <i>Oidium fragariae</i>)	50-75 ml/hl (dose massima: 0.5 lt/ha)	Intervenire dall'inizio della maturazione alla raccolta, allorchè si verificassero le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione. Effettuare massimo 2 trattamenti per ciclo colturale con intervallo di 10 giorni	3 giorni
Pomodoro, Melanzana, Peperone (in campo e in serra)	Oidio (<i>Leveillula taurica</i>)	75 ml/hl (dose massima 0.75 lt/ha)	Intervenire dalla comparsa dei frutti del primo palco fiorale alla maturazione, in concomitanza col verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno. Effettuare massimo 2 trattamenti per ciclo colturale mantenendo un intervallo di 10 giorni.	3 giorni



CAMPI D'APPLICAZIONE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	SPECIE PARASSITA	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Frumento, Orzo	Oidio (<i>Erysiphe graminis</i>), Ruggini (<i>Puccinia spp.</i>), Septoria (<i>Septoria tritici</i>), Elmintosporiosi (<i>Helminthosporium spp.</i>) Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium spp.</i>)	1 lt/ha	Intervenire dalla fine dell'accostamento all'inizio della fioritura. Effettuare massimo 1 trattamento all'anno.	Trattamento consentito fino all'inizio della fioritura.

CONSIGLI D'IMPIEGO: applicare il prodotto preventivamente alle dosi riportate in etichetta. Con condizioni favorevoli allo sviluppo utilizzare la dose massima di etichetta.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: per evitare l'insorgenza di resistenze si raccomanda di applicare il prodotto in alternanza a fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione (MoA)