

# Rufast® Advance

INSETTICIDA-ACARICIDA AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE,  
CON AZIONE TRANSLAMINARE

## Composizione

ABAMECTINA g 0,53 (=5 g/l)  
ACRINATRINA g 0,95 (=9 g/l)

## Formulazione

Emulsione olio/acqua

**Registrazione** N° 16615 del 17/02/2017

## Classificazione CLP

ATTENZIONE



## Confezioni

BOTTIGLIA DA 1L  
(12x1)

**Consigli d'impiego:** Applicare Rufast® Advance generalmente alla prima comparsa dei parassiti. Agisce prevalentemente per contatto, pertanto è necessario assicurare un'uniforme copertura della vegetazione da proteggere. Per tutte le colture in etichetta effettuare 1 sola applicazione per anno o per ciclo colturale.

**Prevenzione e gestione della resistenza:** Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza è consigliabile alternare prodotti aventi differente meccanismo d'azione.

## Campi d'applicazione, dosi e modalità d'impiego

| COLTURA                             | SPECIE PARASSITA  | DOSI                         | MODALITÀ D'IMPIEGO  | INTERVALLO DI SICUREZZA |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------|
| Vite da vino e da tavola            | Tripide ( <i>Frankliniella occidentalis</i> ), Tignole ( <i>Lobesia botrana</i> , <i>Eupoecilia ambiguella</i> ), Ragnetti rossi ( <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i> ), Ragnetto giallo ( <i>Eotetranychus carpini</i> ), Eriofidi ( <i>Calepitrimerus vitis</i> )                        | 175-250 ml/hl (max 2,5 l/ha) | 1 trattamento per anno                                    | 21 giorni               |
| Melo, Pero                          | Psilla del pero ( <i>Cacopsylla pyri</i> ), Psille del melo ( <i>Cacopsylla picta</i> , <i>Cacopsylla melanoneura</i> ), Ragnetti rossi ( <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i> ), Eriofidi ( <i>Epitrimerus pyri</i> , <i>Aculus schlechtendali</i> ), Carpocapsa ( <i>Cydia pomonella</i> ) | 175-250 ml/hl (max 2,5 l/ha) | 1 trattamento per anno                                    | 14 giorni               |
| Pesco, Nettarine                    | Tripidi ( <i>Taeniothrips meridionalis</i> , <i>Thrips tabaci</i> , <i>Thrips angusticeps</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i> ), Ragnetti rossi ( <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i> ), Anarsia ( <i>Anarsia lineatella</i> ), Cidie ( <i>Cydia molesta</i> , <i>Cydia funebrana</i> ) | 175-250 ml/hl (max 2,5 l/ha) | 1 trattamento per anno in pre-fioritura o a caduta petali | Fino a caduta petali    |
| Susino                              | Tripidi ( <i>Taeniothrips meridionalis</i> , <i>Thrips tabaci</i> , <i>Thrips angusticeps</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i> ), Ragnetti rossi ( <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i> ), Anarsia ( <i>Anarsia lineatella</i> ), Cidie ( <i>Cydia molesta</i> , <i>Cydia funebrana</i> ) | 175-250 ml/hl (max 2,5 l/ha) | 1 trattamento per anno                                    | 14 giorni               |
| Agrumi (impianti non in produzione) | Ragnetti rossi ( <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i> )  | 175-250 ml/hl (max 2,5 l/ha) | 1 trattamento per anno                                    | non richiesto           |

| COLTURA   | SPECIE PARASSITA  | Dosi                         | MODALITÀ D'IMPIEGO     | INTERVALLO DI SICUREZZA |
|---|---|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Cetriolo, Zucchini, Pomodoro, Melanzana</b> (pieno campo)  | Ragnetto rosso ( <i>Tetranychus urticae</i> ), Eriofide ( <i>Aculus lycopersici</i> ), Tripide ( <i>Frankliniella occidentalis</i> ), Minatrici foliari ( <i>Liriomyza spp.</i> ) | 175-250 ml/hl (max 2,5 l/ha) | 1 trattamento per anno | 3 giorni                |
| <b>Peperone</b> (pieno campo)   | Ragnetto rosso ( <i>Tetranychus urticae</i> ), Eriofide ( <i>Aculus lycopersici</i> ), Tripide ( <i>Frankliniella occidentalis</i> ), Minatrici foliari ( <i>Liriomyza spp.</i> ) | 175-250 ml/hl (max 2,5 l/ha) | 1 trattamento per anno | 7 giorni                |
| <b>Fragola</b> (pieno campo e serre parzialmente coperta)   | Ragnetto rosso ( <i>Tetranychus urticae</i> ), Tripide ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )  | 175-250 ml/hl (max 2,5 l/ha) | 1 trattamento per anno | 3 giorni                |
| <b>Lattuga</b>  | Ragnetto rosso ( <i>Tetranychus urticae</i> ), Tripide ( <i>Frankliniella occidentalis</i> ), Minatrici foliari ( <i>Liriomyza spp.</i> )   | 175-250 ml/hl (max 2,5 l/ha) | 1 trattamento per anno | 14 giorni               |
| <b>Colture ornamentali e floricole in terra ed in vaso, Vivai di arbustive ed arboree</b> (in serra e serre parzialmente coperte) | Ragnetto rosso ( <i>Tetranychus urticae</i> ), Tripide ( <i>Frankliniella occidentalis</i> ), Minatrici foliari ( <i>Liriomyza spp.</i> )   | 175-250 ml/hl (max 2,5 l/ha) | 1 trattamento per anno | non richiesto           |